



Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

Comité Inter-États des Pesticides de l'Afrique Centrale (CPAC)

DEUXIEME SESSION D'HOMOLOGATION DES PESTICIDES EN AFRIQUE CENTRALE

LISTE DES PESTICIDES HOMOLOGUES EN ZONE CEMAC

DIRECTION GENERALE DU CPAC

Secrétariat de la Commission d'homologation des Pesticides de l'Afrique Centrale

Yaoundé, le 09 mai 2017

I. INSECTICIDES

| N° | Nom Commercial | Nom et teneur en matière(S) actives (S) | Form. | Cl. Tox. OMS | Mode d'action | Dose d'utilisation | Nuisible cible | Spéculation | Restrictions |
|----|----------------|---|-------|--------------|---------------|---|----------------------------|-------------|---|
| 01 | SUPER 12 EC | Cyperméthrine 12 g/l | EC | II | Par contact | 4L p.c. /ha (180 ml p.c/pulvérisateur de 15litres) | Chenilles des lépidoptères | Tomates | -Porter obligatoirement les Equipements de Protection Individuelle (EPI) ; -Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles ; -Respecter les délais avant récolte de 14 jours |
| 02 | SUPER 50 EC | Cyperméthrine 50 g/l | EC | II | Par contact | 0.75L p.c. /ha (32 ml p.c/pulvérisateur de 15litres) | Chenilles des lépidoptères | Tomates | -Porter obligatoirement les EPI -Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles ; -Respecter les délais avant récolte de 14 jours |

II. HERBICIDES

| N° | Nom Commercial | Nom et teneur en matière(S) actives (S) | Form. | Cl. Tox. OMS | Mode d'action | Dose d'utilisation | Nuisible cible | Spéculation | Restrictions |
|----|----------------------|---|-------|--------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|--|
| 01 | GLYCOL 41% SL | Glyphosate 480g/L | SL | III | Systémique non sélectif | 3L p.c. /ha | Les adventices du palmier à huile en post levée | Palmier à huile | -Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) |
| 02 | GLYCOL 680 WDG | Glyphosate 680 g/kg | WP | III | Systémique non sélectif | 1,35kg.p.c/ha | Les adventices du palmier à huile en post levée | Palmier à huile | -Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) -Utiliser loin des cours d'eau |
| 03 | SUPER KILLER 680 WDG | Glyphosate 680 g/kg | WP | III | Systémique non sélectif | 1,35kg.p.c/ha | Les adventices du palmier à huile en post levée | Palmier à huile | -Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) -Utiliser loin des cours d'eau |

III. FONGICIDES

| N° | Nom Commercial | Nom et teneur en matière(S) actives (S) | Form. | Cl. Tox. OMS | Mode d'action | Dose d'utilisation | Nuisible cible | Spéculation | Restrictions |
|----|----------------|---|-------|--------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|---|
| 01 | AGREB 80 WP | Manèbe 800 g/kg | WP | III | Par contact | 2kg p.c./ha | Mildiou | Tomates | -Porter obligatoirement les EPI -Utiliser loin des cours d'eau ; -Respecter les délais avant récolte de 7 jours |

IV. PRODUITS D'HYGIENE PUBLIQUE

| N° | Nom Commercial | Nom et teneur en matière(S) actives (S) | Form. | Cl. Tox. OMS | Mode d'action | Dose d'utilisation | Nuisible cible | Spéculation | Restrictions |
|----|----------------|---|-------|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| 01 | BOXER 10 WP | Lambda-cyhalothrine 100g/kg | WP | II | Par contact | 25g p.c/10 litres d'eau | -Moustiques -Autres insectes volants et rampants | Milieus fréquentés par l'homme | -Porter les Equipements de Protection corporelle, notamment les lunettes ; -Utiliser loin des cours d'eau |